


Japan
Food
Research
Labs

第 09016230001-01 号
2009年(平成21年)12月23日

試験報告書

依頼者 ニチリンケミカル株式会社



検体 セルフィール

表題 ウイルス不活化試験

2009年(平成21年)10月21日当センターに提出された上記検体について試験した結果をご報告いたします。

本報告書を他に掲載するときは当センターの掲載規約をお守りください。

財団法人
日本食品分析センター

ウイルス不活化試験

1 依頼者

ニチリンケミカル株式会社

2 検体

セルフィール

3 試験目的

検体のインフルエンザウイルスに対する不活化試験を行う。

4 試験概要

検体にインフルエンザウイルス浮遊液を添加、混合し、作用液とした。室温で作用させ、5分後に作用液のウイルス感染価を測定した。

なお、あらかじめ予備試験を行い、ウイルス感染価の測定方法について検討した。

5 試験結果

結果を表-1に示した。

なお、細胞維持培地で作用液を100倍に希釈することにより、検体の影響を受けずにウイルス感染価が測定できることを予備試験により確認した。

表-1 作用液のウイルス感染価測定結果

| 試験ウイルス | 対象 | log TCID ₅₀ /ml* | |
|-----------------|----|-----------------------------|------|
| | | 開始時 | 5分後 |
| インフルエンザ ウイルス | 検体 | 6.7 | <2.5 |
| | 対照 | 6.7 | 6.3 |

TCID₅₀ : median tissue culture infectious dose, 50 %組織培養感染量

* 作用液1 ml当たりのTCID₅₀の対数値

開始時：作用開始直後の対照のTCID₅₀を測定し、開始時とした。

対照：精製水

作用温度：室温

ウイルス浮遊液：精製水で10倍に希釈したもの

<2.5：検出せず

6 試験方法

1) 試験ウイルス

インフルエンザウイルスA型(H1N1)

2) 使用細胞

MDCK (NBL-2) 細胞 ATCC CCL-34株[大日本製薬株式会社]

3) 使用培地

① 細胞増殖培地

イーグルMEM培地「ニッスイ」①[日水製薬株式会社]に牛胎仔血清を10 %加えたものを使用した。

② 細胞維持培地

以下の組成の培地を使用した。

| | |
|------------------------|---------|
| イーグルMEM培地「ニッスイ」① | 1000 ml |
| 10 %NaHCO ₃ | 14 ml |
| L-グルタミン(30 g/L) | 9.8 ml |
| 100×MEM用ビタミン液 | 30 ml |
| 10 %アルブミン | 20 ml |
| 0.25 %トリプシン | 20 ml |

4) ウィルス浮遊液の調製

① 細胞の培養

細胞増殖培地を用い、使用細胞を組織培養用フラスコ内に単層培養した。

② ウィルスの接種

単層培養後にフラスコ内から細胞増殖培地を除き、試験ウイルスを接種した。次に、細胞維持培地を加えて37 °C±1 °Cの炭酸ガスインキュベーター(CO₂濃度：5 %)内で1～5日間培養した。

③ ウィルス浮遊液の調製

培養後、倒立位相差顕微鏡を用いて細胞の形態を観察し、細胞に形態変化(細胞変性効果)が起こっていることを確認した。次に、培養液を遠心分離(3000 r/min, 10分間)し、得られた上澄み液を精製水で10倍に希釈し、ウィルス浮遊液とした。

5) 試験操作

検体1 mlにウィルス浮遊液0.1 mlを添加、混合し、作用液とした。室温で作用させ、5分後に細胞維持培地を用いて100倍に希釈した。

なお、精製水を対照として同様に試験し、開始時についても測定を行った。

6) ウイルス感染価の測定

細胞増殖培地を用い、使用細胞を組織培養用マイクロプレート(96穴)内で単層培養した後、細胞増殖培地を除き細胞維持培地を0.1 mlずつ加えた。次に、作用液の希釀液0.1 mlを4穴ずつに接種し、37 °C±1 °Cの炭酸ガスインキュベーター(CO₂濃度：5 %)内で4～7日間培養した。培養後、倒立位相差顕微鏡を用いて細胞の形態変化(細胞変性効果)の有無を観察し、Reed-Muench法により50 %組織培養感染量(TCID₅₀)を算出して作用液1 ml当たりのウイルス感染価に換算した。

以 上